

Priocca, 15/01/2025

Alle famiglie e a tutto il personale scolastico della scuola

Sito web e atti

## **OGGETTO: Prevenzione e gestione della pediculosi nelle scuole –**

Si ritiene opportuno, in osservanza delle norme di prevenzione nella scuola e riscontrato qualche sparuto episodio, ribadire con la presente nota il comportamento da seguire in caso di pediculosi.

Si confida che i genitori già sensibili al problema, effettuino sui propri figli un controllo preventivo il più possibile attento e frequente ed avviino, qualora l'infestazione sia già in atto, una terapia mirata con i prodotti specifici prescritti dal pediatra o dal medico di famiglia.

Si sollecitano pertanto i genitori a promuovere con attenzione l'igiene personale e l'ispezione dei capelli.

**In caso di infestazione da *P. humanus corporis* isolamento da contatto per non meno di 24 ore dall'inizio di un adeguato trattamento disinfestante.**

Qualora esistessero dubbi sulla effettiva presenza dell'infestazione, il Dirigente Scolastico può, in via cautelativa, richiedere una visita del medico curante ed idonea certificazione attestante o l'assenza dell'infestazione o l'avvenuto trattamento.

Si allega depliant "Il pidocchio dei capelli" con le informazioni da attuare, la scheda sulle "misura di profilassi pediculosi" ai sensi della Circolare Ministro Sanità n. 4/1998.

Si ringraziano le famiglie per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura Ragazzo  
*documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme correlate*

**Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica**  
**PEDICULOSI - FTIRIASI ICD-9 132 - 132.9**

Classe di notifica: IV

Periodo di incubazione	Periodo di contagiosità	Provvedimenti nei confronti del malato	Provvedimenti nei confronti di conviventi e contatti
In condizioni ottimali per il ciclo vitale dei pidocchi, da 6 a 10 giorni in caso di infestazione con uova.	Fintanto che uova, forme larvali o adulte sono presenti e vitali sulle persone infestate o su indumenti ed altri <i>fomites</i> .	In caso di infestazione da <b>P. humanus corporis</b> <u>isolamento da contatto</u> per non meno di 24 ore dall'inizio di un adeguato trattamento disinfestante. Il trattamento disinfestante consiste nell'applicazione di polvere di talco contenente DDT al 10% oppure Malathion all'1% oppure permetrina allo 0,5% o altri insetticidi. Gli indumenti vanno trattati con gli stessi composti applicati sulle superfici interne oppure lavati con acqua bollente. In caso di infestazioni da <b>P. humanus capitis</b> , restrizione della frequenza di collettività fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante. Il trattamento disinfestante, consiste in applicazione di shampoo medicati contenenti permetrina all'1% o piretrine associate a piperonilbutossido, o benzilbenzoato o altri insetticidi, deve essere periodicamente ripetuto ogni 7-10 giorni per almeno un mese. Pettini e spazzole vanno immersi in acqua calda per 10 minuti e/o lavati con shampoo antiparassitario. In caso di infestazioni da <b>Phthirus pubis</b> le zone interessate vanno rasate; i trattamenti disinfestanti sono simili a quelli da adottare per il P. humanus capitis e, se non sufficienti, vanno ripetuti dopo 4-7 giorni di intervallo.	<u>Sorveglianza sanitaria</u> per l'identificazione di altri casi di parassitosi, e conseguente trattamento disinfestante. I compagni di letto ed i partners sessuali di soggetti infestati da <i>P. pubis</i> devono essere trattati in via profilattica con gli stessi prodotti impiegati per i casi di infestazione conclamata.